

**SERVIZIO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA DIAGNOSTICA E OPERATIVA - OSPEDALE DI GALLIPOLI**

PAZIENTE

DATA

ORA

PREPARAZIONE ALLA GASTROSCOPIA:

Portare documentazione sanitaria precedente. L'assistito, in caso di sedazione, dopo l'esame non potrà guidare, quindi deve essere accompagnato da una persona che guidi. Togliere prima dell'esame eventuali piercing, collane, orecchini, bracciali, orologi, protesi dentali mobili.

Se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti o antiaggreganti vedi schema in basso. E' preferibile sospendere almeno due settimane prima farmaci gastro-protettori (lansoprazolo, omeprazolo, pantoprazolo, esomeprazolo), ma si possono assumere antireflusso come gaviscon, riopan, marial,refalgin,biochetasi, maalox, geffer etc.

Gestione farmaci antidiabetici/ antiobesità: Se si stanno assumendo uno dei seguenti farmaci:

Semaglutide (Ozempic, rybelsus, wegovy), Liraglutide (victoza, saxenda) Tirzepatide (Mounjaro), Dulaglutine (Trulicity): sospendere *7 giorni prima dell'esame* in caso di somministrazione settimanale, *24 ore prima* in caso di somministrazione giornaliera.

PREPARAZIONE ALLA GASTROSCOPIA SE L'ESAME E' PROGRAMMATO DI MATTINA (ore 8-13): è possibile mangiare la sera prima dell'esame entro le ore 20.00 e poi digiuno sino ad eseguire l'esame endoscopico (è possibile bere acqua fino a tre ore prima dell'esame ed assumere la propria terapia con un sorso d'acqua il giorno dell'esame).

PREPARAZIONE ALLA GASTROSCOPIA SE L'ESAME E' PROGRAMMATO DI POMERIGGIO (ore 14-20) : è possibile fare la mattina dell'esame una colazione leggera entro le 07.00 e poi digiuno fino alla esecuzione della gastroscopia (è possibile bere acqua fino a tre ore prima dell'esame ed assumere la propria terapia).

N.B La gastroscopia viene eseguita con anestesia locale del faringe (lidocaina spray) eventualmente associata a midazolam endovena (sedazione cosciente).

GESTIONE FARMACI ANTIAGGREGANTI E ANTICOAGULANTI:

Avvisare il servizio di endoscopia o il proprio medico curante in caso si stiano assumendo uno o più dei seguenti farmaci. Il presente schema rappresenta la modalità di sospensione standard degli antiaggreganti/anticoagulanti ma ogni valutazione deve avvenire in base al quadro clinico e con il parere medico.

CARDIOASPIRINA CARDIRENE, ASPIRINETTA	Non sospendere in caso di pregresso ictus,infarto,bypass, stent coronarie. Sospendere 5 giorni prima se si assume per prevenzione primaria
PLAVIX ,CLOPIDOGREL, TIKLID, BRILIQUE, EFIENT	Sospendere 7 giorni prima della procedura.
PLAVIX + CARDIOASPIRINA (DUOPLAVIN)	Contattare il cardiologo di fiducia per sospensione del duoplavin. Qualora possibile, sospendere 7 giorni prima duoplavin, mantenendo solo cardioaspirina
COUMADIN, SINTROM	Contattare centro di coagulazione. PT INR deve essere minore di 1.5 prima dell'esame
PRADAXA, ELIQUIS, XARELTO, LIXIANA, RIVAROXABAN,DABIGATRAN	Sospendere 48 ore prima (ultima somministrazione 3 giorni prima della procedura). Non somministrare eparina sottocute in sostituzione dell' anticoagulante orale salvo diversa indicazione del cardiologo di fiducia
ARIXTRA	Sospendere 24 ore prima
CLEXANE (ENOXAPARINA)	Sospendere 12 ore prima